

DERMI-CARE®

Procesos dermatológicos

Reg. ICA: 6790-MV

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de CREMA contienen:

Ketoconazol.....	1 g
Neomicina (como sulfato).....	0.5 g
Betametasona	0.05 g
Lidocaína HCl.....	2.0 g
Óxido de zinc.....	5.0 g
Excipientes c.s.p	100 g

USO EN:

DESCRIPCIÓN: Crema dermatológica de acción bactericida y fungicida, útil para tratar todas aquellas enfermedades de piel, acompañadas de procesos inflamatorios y/o cicatrizales.

ACCIÓN

Neomicina sulfato: Antibiótico aminoglucósido de amplio espectro que actúa a nivel ribosomal de la bacteria, lo que impide el proceso de formación de proteínas (no hay proceso de duplicación celular) y replicación del ADN, ocasionando la muerte bacteriana.

Ketoconazol: Antimicótico, impide el crecimiento de los micelios de los hongos y causa destrucción del mismo por lisis (se consume él mismo). Actúa sobre un 90% de los hongos. Como es una generación nueva de antimicóticos, no hay resistencia.

Betametasona: Antiinflamatorio de potente acción corticoide local, con efecto antipruriginoso.

Lidocaína: Anestésico local, disminuye la transmisión de impulsos nerviosos (eliminando el prurito), por ende, no hay irritación ni dolor en la zona afectada.

Óxido de zinc: Cicatrizante, aumenta la migración de granulocitos, y estimulante de la formación de hilos de colágeno para regenerar la piel (textura y unidad de membrana).

VENTAJAS

- Exclusiva formulación indicada para el tratamiento de todas las afecciones de la piel, ocasionadas por procesos infecciosos, fúngicos, alérgicos e irritativos de la piel.
- La inclusión de aloe vera permite una rápida penetración del producto y mejora la hidratación, textura y recuperación de la piel afectada.
- Indicada en procesos infecciosos indiscriminados de la piel por su amplio espectro.
- Puede ser utilizado en heridas abiertas, gracias a la presencia del óxido de zinc.

INDICACIONES: En **perros, gatos, equinos** y **bovinos** como bactericida, fungicida, astringente y antiinflamatorio en afecciones de la piel de tipo infecciosas y fúngicas.

DOSES: Aplicar 2 a 3 veces por día en el área afectada hasta recuperación total.

Si hay presencia de hongos, aplicar durante 15 días después de la recuperación de la piel.

PRESENTACIONES: Tubo de 20 g y 40 g.

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.